

Marcumar®

Phenprocoumon

Antikoagulation

Antidot

Vitamin K

Novo7

PPSP

Hemmung der
plasmatischen
Blutgerinnung

Thrombose-
Rezidivprophylaxe

Implantation künstlicher
Herzklappen/künstlicher
Gefäß-Bypässe

Herzunterstützungssysteme

Vorhofflimmern

Embolien vorzubeugen

Lungenembolie

Wirkung ⚡

Reduktion der Menge an
verfügbaren funktionstüchtigen
Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X

Einstellungsphase von
etwa 5–7 Tagen ⚙️



www.wenzlaff.info

Wenn Sie Blutverdünner einnehmen und Fragen haben,
handeln Sie nicht eigenmächtig, sondern gehen Sie
zunächst zum Arzt und lassen sich von ihm beraten.

/Marcumar ®

<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Phenprocoumon>

/Marcumar ®/Phenprocoumon

<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Phenprocoumon>

/Marcumar ®/Antidot/Novo7

http://www.iakh.de/tl_files/oldcontent/Literatur/aFVII.pdf

/Marcumar ®/Antidot/PPSP

<https://de.m.wikipedia.org/wiki/PPSB>

/Marcumar ®/www.wenzlaff.info

<http://www.wenzlaff.info>

