von-Willebrand-Syndrom

Gesamtzahl aller gemeldeter Patienten in Deutschland im Jahr 2015
- 3930

nach dem finnischen Arzt Erik Adolf von Willebrand (1870–1949) und dem deutschen Arzt Rudolf Jürgens (1898–1961)

"von-Willebrand-Jürgens-Syndrom"

VWS

mit VWS wird ein bestimmtes Eiweiß, der so genannte Von-Willebrand-Faktor (VWF) nicht ausreichend gebildet

angeborene Störung der Blutgerinnung

Das VWS wird durch das Fehlen oder eine zu geringe und fehlerhafte Bildung eines wichtigen Eiweißes, des von-Willebrand-Faktors (VWF) verursacht.

erhöhten Blutungsrisiko

VWF ist ein an der Gerinnung beteiligter Faktor und für eine normale Blutstillung (Blutgerinnung) unbedingt notwendig

zeitlebens an einer verminderten Gerinnungsfähigkeit des Blutes



Erbkrankheit

spezialisiertes Behandlungszentrum
- Vasopressin (Desmopressin, DDAVP)
- Ersatz von VWF (Faktor-Substitutionstherapie)
  - auch aus menschlichem Blutplasma gewonnen
- Antifibrinolytika
  - Tranexamsäure
- Faktor VIII

Manchmal kann das VWS auch im Laufe des Lebens erworben werden

"Verbotene" Medikamente
- Acetylsalicylsäure
  - Aspirin

Notfallausweis PaVo

Klassifikation des VWS Typ 1-3

Krankheitszeichen
- Neigung zu blauen Flecken
- Nasenbluten
- starkes Zahnfleischbluten
- starke und lange Regelblutungen

www.kleinhirn.eu